

植牙的好處

“免除修磨兩側牙齒的麻煩，
與真牙無異”

- 替代一隻或多隻的缺失牙齒，不用磨損鄰近健全的牙齒
- 一勞永逸
- 有助防止牙骨萎縮
- 正常刷牙漱口已足夠保持植牙健康
- 讓你笑容再現，充滿自信
- 能夠如真牙般咀嚼

▼ 後牙種植個案



• 治療前



• 治療後



• 治療後X光片



• 後牙種植情況

植牙手術後須注意的事項

1. 植牙後，在傷口癒合前應避免劇烈運動、過度疲勞和高溫浸浴。
2. 手術後二至三天內，傷口處可能仍會有腫脹的情況，請冷敷患處臉側。若患處仍有腫痛情況，請告知你的牙醫並接受適當的治療。
3. 手術後二至三天內請用漱口水保持口腔清潔，避免以牙刷觸及傷口。
4. 手術後二至三周內請勿吸煙及飲酒。
5. 避免進食過熱食物或飲料，請用手術的另一側咀嚼食物。
6. 已進行上顎竇手術的病人請勿用力吐痰、擤鼻涕或打噴嚏。
7. 如果持續出血，請咬緊以冷水沾濕的紗布；如果仍然持續嚴重出血，請即求醫。

意見：



重現你自信的笑容 你需要植牙嗎？



美國Hiossen公司位於美國賓夕法尼亞州，
為全球領先的種植體公司。

Made in USA



牙齒脫落後不處理會怎樣？

牙齒脫落後不處理
可引致下列問題



- 缺牙位置後方的牙齒可能會往中間空位傾斜，造成牙齒排列不整齊，導致咬合異常
- 咀嚼時，增加其餘牙齒所承受的咬合力
- 缺牙位置牙骨萎縮
- 剩餘牙齒牙縫逐漸擴闊，影響美觀和儀容
- 失去自然笑容

牙齒缺失後該如何補回？

1. 活動假牙托 (RPD)

利用金屬鈎扣在牙齒上，以固定假牙托，代替失去的牙齒。

缺點：

- 周邊牙齒承受額外的咬合力
- 缺牙位置牙骨持續萎縮



活動假牙托

2. 固定牙橋

利用牙橋分別套在左右的牙齒上，中間為假牙，以替補缺失的牙齒。

缺點：

- 左右兩端的牙齒必須被磨小，更有可能需接受根管治療
- 兩端的牙齒需承受額外咬合力



3. 植牙

鈦金屬植體是身體能接受的，植體植入牙槽骨內，然後在上面鑲嵌人造牙冠、牙橋或放置假牙托。

植體是永久的，有長期臨床的成功率。

相比傳統活動假牙托或固定牙橋，植牙是現今替代缺牙的先進方法。

